Linha Pecuária

Quem melhora o gado é...

Roboforte

O OLHO DO DONO

Índice

Anti-inflamatório
Ketofen 4

Antibióticos
Florkem 4
Partocilina 4
Penikel LA 5
Tyladen 5
Agrodel Plus 5
Curseon Injetável 5
Oxitape LA 6
Tilmicovet 6
Amoclox S 6
Cefavet 6
Genta F 7

Facilitador de Secagem
Velactis 7

Vacinas
Anavac 7
Botulinomax 9
Hertamax-10 9
IBR-BVD 9
Leptovac 6 10
Rabmune 10
Tifopasteurina 10

Ectoparasiticidas
Cicatrilex Prata 11
Cyperclor Plus Pour On 11
Cyperclor Plus Pulverização 11
Cyperpour 15 Pulverização 12
Combo Pour On 12
Fiproline BV 12
Fluron Gold 13

Endectocidas
ADE-TEC 13
Puritec Gold 13
Ticson 3.50 15
Ticson Classic 15

Ambiental
Swat NF 15

Hormônios Para Reprodução
Afisterone 16
Androgenol 16
Benzoato HC 16
Cipionato HC 17
Pluset 17
Veteglan 17
Prociclar 18

Hormônio não reprodutivo
Ocitovet 18

Tripanocida
Vivedium 18

Suplementos
Rehydion 20
ADE 20
Calcifós 20
Hertavita 21
Hertaka 21
Roboforte 21

Sedativos
Anasedan 22
Dopalen 22
Dorfin 22

Anti-inflamatório

Ketofen

Descrição e indicações: Anti-inflamatório não esteroidal, à base de Cetoprofeno para uso em bovinos, com descarte ZERO para o leite e sem carência para o abate dos animais tratados. Indicado para controle da dor, febre e inflamações nos bovinos, equinos e suínos.

Formulação: Cetoprofeno 10%

Apresentações comerciais: Frascos de 10 mL e 50 mL

Instruções de uso: aplicar por via intramuscular as seguintes doses conforme a espécie animal
Bovinos e suínos: 1 mL/33 Kg p.v. ou 3 mL/100 Kg p.v., correspondente a 3 mg de cetoprofeno/Kg p.v.
Equinos: 1 mL/45 Kg p.v., correspondente a 2,2 mg de cetoprofeno/Kg p.v.

Período de carência:
Bovinos:
Leite: ZERO • **Abate**: ZERO
Suínos: ZERO dias para o abate dos animais tratados
Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano

Benefícios:
- Rapidez no controle da inflamação, dor e febre
- Sem descarte ou período de carência

Antibióticos

Florkem

Descrição e indicações: Antimicrobiano de amplo espectro, pronto para uso, à base de Florfenicol para uso nos bovinos. Indicado para o tratamento das doenças respiratórias (broncopneumonias), infecções dos pés e cascos, diarréias, infecções nos olhos (ceratoconjuntivite), proporcionando rápido retorno à produção.

Formulação: Florfenicol 30%

Apresentações comerciais: Frascos de 30 mL e 50 mL

Instruções de uso: aplicar, por via intramuscular, 1 mL/15 Kg p.v. Uma segunda dose pode ser necessária 48 horas após a primeira. Após a abertura do frasco, utilizar em até 6 meses.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano • **Abate:** 20 dias

Benefícios:
- Rápida recuperação e retorno à produção
- Amplo espectro e alta eficácia
- Número reduzido de tratamentos

Partocilina

Descrição e indicações: associação antibiótica bactericida de amplo espectro com anti-hemorrágico, mioconstritor uterino e vasodilatador. Indicada para tratamento e prevenção das infecções uterinas pós-parto, especialmente associadas à retenções de placenta e partos difíceis em vacas, éguas e porcas, com tratamento em dose única.

Formulação: Penicilina G Sódica 2.000.000 UI + Penicilina G Clemizolo 2.000.000 UI + Sulfato de Dihidroestreptomicina 4,05 g + Ergometrina 0,005 g + Vitamina K3 0,5 g + Difilina 1 g

Instruções de uso: misturar o diluente ao frasco com o pó, homogeneizar bem e aplicar por via intramuscular profunda, em dose única, as seguintes doses:
Vacas e éguas: 20 mL
Porcas: 10 mL

Período de carência: **Leite**: 27 dias • **Abate**: 56 dias

Benefícios:
- Amplo espectro bactericida
- Previne e trata infecções uterinas
- Facilita o descolamento e a expulsão da placenta retida
- Acelera a involução uterina
- Controle de possíveis hemorragias
- Altos níveis antibióticos bactericidas no ambiente uterino

Penikel LA

Descrição e indicações: associação pronta para uso de duas penicilinas proporcionando amplo espectro combinando rápida e prolongada ação bactericida. Indicada para tratamento de infecções em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

Formulação: cada 100 mL contém Penicilina Procaína 15.000.000 UI + Penicilina Benzatina 15.000.000 UI

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL

Instruções de uso: produto pronto para uso. Após agitar o frasco, aplicar por via intramuscular profunda, 2 mL a 3 mL para cada 50 Kg de p.v. Caso necessário, repetir o tratamento 3 dias após.

Período de carência:
Leite: 10 dias • **Abate:** 30 dias

Benefícios:
- Efeito rápido e prolongado (Penicilina Procaína: rápido pico plasmático; Penicilina benzatina: ação prolongada)
- Amplo espectro
- Dose única na maioria das vezes
- Multi-espécies

Tyladen

Descrição e indicações: antimicrobiano para uso em bovinos, suínos e caprinos. Indicado para tratamento de doenças respiratórias, infecções dos pés e cascos, infecções uterinas, infecções das articulações, mastites, causadas por germes Gram Positivos.

Formulação: Tilosina 20%

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL e 100 mL

Instruções de uso: aplicar 1 mL/ 20 Kg p.v. diariamente, por via intramuscular profunda. Nos bovinos o tratamento deverá ser realizado por no mínimo 3 dias. Nas demais espécies o tratamento deverá ser realizado por no máximo 3 dias.

Período de carência:
Leite: 4 dias • **Abate:** 21 dias

Benefícios:
- Rápida absorção e altas concentrações nos tecidos com infecção
- Fácil aplicação
- Opção para tratamento de mastites de difícil cura como as causadas por *Mycoplasma spp* e *Staphylococcus aureus*. Nestes casos associar a injeção intramuscular com a aplicação intramamária de 2 mL diluídos em 20 mL de propilenoglicol estéril

Agrodel Plus

Descrição e indicações: antibiótico bactericida de amplo espectro indicado para o tratamento de infecções diversas dos bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

Formulação: Penicilina Benzatina 3.000.000 UI + Penicilina Procaína 1.500.000 UI + Penicilina Potássica 1.500.000 UI + Sulfato de Estreptomicina 2,5 g + Piroxicam 0,3 g

Apresentações comerciais: Frasco ampola + diluente estéril com 15 mL

Instruções de uso: acrescentar o diluente no frasco-ampola, homogeneizar (misturar) bem, e aplicar uma dose/dia por via intramuscular profunda. Não exceder mais que 10 mL por local de aplicação. O tratamento deverá ser realizado durante 3 a 5 dias. Após a reconstituição, o produto poderá ser armazenado por 7 dias quando mantido a temperatura entre 3 C e 6 C.

Período de carência:
Leite: 5 dias • **Abate:** 30 dias

Benefícios:
- Amplo espectro
- Multi-espécies

Curseon Injetável

Descrição e indicações: antimicrobiano de amplo espectro para tratamento de infecções respiratórias, entéricas e genito-urinárias dos bovinos, equinos e suínos.

Formulação: Sulfadimetoxina 20% + Trimetoprim 4%

Apresentações comerciais: Frascos com 50 mL

Instruções de uso: aplicar por via intramuscular profunda as seguintes dosagens:
- Adultos: 4 mL/50 Kg p.v.
- Bezerros: 1 mL/10 Kg p.v.

Período de carência:
Leite: 10 dias • **Abate:** 10 dias

Benefícios: Associação sinérgica potencializando o efeito antimicrobiano

Oxitape LA

Descrição e indicações: antimicrobiano de amplo espectro para uso em bovinos, equinos e suínos. Indicado para tratamento de infecções respiratórias, anaplasmose bovina, infecções dos pés e cascos, diarréias, actinobacilose, necrobacilose oral bovina, infecções do trato genito-urinário, garrotilho dos equinos e doença do edema nos suínos.

Formulação: Cloridrato de Oxitetraciclina 22% (equivalente a 20% de oxitetraciclina)

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL

Instruções de uso: aplicar por via intramuscular profunda, 1 mL/10 Kg de p.v., respeitando-se o máximo de 10 mL por ponto de aplicação. Normalmente apenas um tratamento é necessário, porém o tratamento pode ser repetido entre 48 e 72 horas.

Período de carência:
Leite: não aplicar em vacas que produzam leite para consumo humano • **Abate:** 30 dias

Benefícios:
- Amplo espectro
- Geralmente apenas um tratamento é necessário

Tilmicovet

Descrição e indicações: antimicrobiano indicado para tratamento das infecções respiratórias dos bovinos.

Formulação: Tilmicosina 30%

Apresentações comerciais: Frascos de 100 mL

Instruções de uso: a dose indicada é de 1 mL/30 Kg de p.v. por via subcutânea. Repetir o tratamento após 72 horas.

Período de carência:
Leite: não indicado para vacas leiteiras que estejam produzindo leite para consumo humano
Abate: 28 dias

Benefícios:
- Amplo espectro sobre as principais bactérias envolvidas na doença respiratória bovina
- Rápida chegada nos tecidos alvo e em altas concentrações
- Permanência em concentrações efetivas por até 72 horas nos tecidos alvo infectados

Amoclox S

Descrição e indicações: associação antibiótica bactericida sinérgica de amplo espectro, eficaz mesmo sobre bactérias penicilino-resistentes. O produto é indicado para a prevenção de mastites durante o período seco da lactação.

Formulação: Amoxicilina Trihidratada 0,2 g + Cloxacilina Benzatínica 0,2 g + Excipientes

Apresentações comerciais: Seringas intramamárias, contendo 7 g

Instruções de uso: após a última ordenha (secagem), desinfetar convenientemente o canal do teto e, posteriormente, aplicar todo o conteúdo de uma seringa em cada quarto mamário, massageando-os suavemente de baixo para cima, a fim de facilitar a difusão do produto no quarto mamário tratado.

Período de carência:
Leite: não utilizar o produto durante o período da lactação • **Abate:** 30 dias

Benefícios:
- Amplo espectro
- Eficiente mesmo em bactérias produtoras de betalactamases

Cefavet

Descrição e indicações: moderno antibiótico bactericida de amplo espectro e de alta permanência local, associado a anti-inflamatório indicado para o tratamento das mastites durante o período de lactação.

Formulação: cada seringa contém suspensão oleosa com 250 mg de Cefoperazona Sódica + 4 mg de Acetado de Prednisolona + Excipientes

Apresentações comerciais: Seringas intramamárias com 10 mL cada uma

Instruções de uso: após a ordenha completa do quarto mamário a ser tratado (Ocitovet pode ser empregado para facilitar tal procedimento), desinfetar convenientemente o canal do teto e aplicar o conteúdo de uma seringa no mesmo. Logo a seguir, massagear suavemente de baixo para cima, auxiliando a completa difusão do produto no quarto mamário tratado. Caso seja necessário, aplicar um segundo tratamento 48 horas após o primeiro.

Período de carência:
Leite: 84 horas (3,5 dias) • **Abate:** 1 dia

Benefícios:
- Não é irritante para o úbere
- A Cefoperazona permanece por até 48 horas no quarto mamário tratado
- Auxilia na redução do inchaço e da dor nos casos de mastites, facilitando a ação antibiótica

Genta F

Descrição e indicações: preparação antibiótica bactericida de amplo espectro indicada para o tratamento das mastites nas vacas em lactação.

Formulação: Sulfato de Gentamicina 2,5% + Dimetilsulfóxido (DMSO) 65%

Apresentações comerciais: Seringas intramamárias com 10 mL cada uma

Instruções de uso: após a ordenha completa do quarto mamário a ser tratado (Ocitovet pode ser empregado para facilitar tal procedimento), desinfetar convenientemente o canal do teto e aplicar o conteúdo de uma seringa no mesmo. Logo a seguir, massagear suavemente de baixo para cima, auxiliando a completa difusão do produto no quarto mamário tratado. Continuar o tratamento por 3 a 5 dias ou até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Período de carência: Leite: 5 dias • **Abate:** 14 dia

Benefícios:

- Amplo espectro
- Redução do inchaço
- Baixo custo

Facilitador de Secagem

Velactis

Descrição e indicações: exclusivo facilitador de secagem para vacas leiteiras de alta produção que permite a secagem abrupta nos animais em qualquer nível de produção, facilitando manejo, favorecendo a saúde do úbere, o bem estar animal e contribuindo para maior rentabilidade. O produto evita a pressão e o vazamento de leite, comuns logo após a secagem, especialmente nas vacas de alta produção.

Formulação: Cabergolina 0,112%, um derivado do ergot que atua no hipotálamo levando a rápida inibição da produção de prolactina na hipófise e a consequente queda da produção de leite.

Apresentações comerciais: Frascos de 5 mL e frascos de 25 mL

Instruções de uso: aplicar por via intramuscular, em um único tratamento, 5 mL da solução (5,6 mg de cabergolina) por vaca, logo após a última ordenha (secagem). O produto deverá ser totalmente usado até 28 dias após a abertura do frasco. Mulheres grávidas não devem manusear o produto.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** 23 dias

Benefícios:

- Impacto positivo no manejo da secagem
- Impacto positivo na saúde do úbere
- Impacto positivo no bem-estar da vaca
- Permite o produtor ou técnico interferir na duração do período seco até o mínimo de 45 dias.

Vacinas

Anavac

Descrição e indicações: vacina para prevenção da Brucelose Bovina.

Formulação: suspensão liofilizada de *Brucella abortus* Cepa B-19 com um mínimo de 60 bilhões desta cepa bacteriana por dose.

Apresentações comerciais: Frascos com liofilizado + frasco com diluente de 30 mL (15 doses)

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2 C e 8 C). A vacina só deve ser aplicada nas bezerras entre 4 e 8 meses de idade. Após a reconstituição e homogeneização do liofilizado no diluente, aplicar 2 mL por via subcutânea. Utilizar logo após a preparação. Não reutilizar sobras da vacina que deverão ser descartadas convenientemente (queimadas e enterradas profundamente). Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo. Não realizar tratamentos antimicrobianos quando da vacinação.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Prevenção da brucelose bovina
- Vacina obrigatória de acordo com o PNCEBT - MAPA (Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose)

velactis®

onde tudo começa!

Nunca foi tão fácil fazer secagem!

IMPACTO NO MANEJO

- Permite o manejo de secagem abrupto independentemente do nível de produção.
- Evita a redução da produção anterior à última ordenha.
- Coloca a duração do período seco na mão do produtor ou técnico.

IMPACTO NA SAÚDE DO ÚBERE

- Reduz o nível de vazamento de leite.
- Reduz o risco de novas infecções intramamárias.
- É uma alternativa no contexto do uso racional de antibióticos.

IMPACTO NO BEM-ESTAR

- Reduz o ingurgitamento e o excesso de pressão interna no úbere.
- Reduz a dor causada pelo ingurgitamento.
- Aumenta o tempo de descanso após a secagem.

ceva

Botulinomax

Descrição e indicações: proteção contra as principais clostridioses (Botulismo, Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa ou Edema Maligno, Enterotoxemia por Clostrídeos, Hepatite Necrótica Infecciosa, Doença do Rim Polposo, Morte Súbita por Clostrídeos), que podem afetar os bovinos, ovinos e caprinos.

Formulação: suspensão de toxóides e bacterinas de *Clostridium botulinum* Tipos C e D; *C. chauvoei*; *C. septicum*; *C. sordellii; C. perfringens* Tipos B, C e D; *C. novyi* inativadas e adsorvidas em hidróxido de alumínio.

Apresentações comerciais: Frascos com 20 doses e frascos com 50 doses

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2 C e 8 C). Agitar o frasco antes de usar. Aplicar, por via subcutânea. A dose é de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos. A 1a dose deverá ser aplicada entre os 3 e 4 meses de idade e repetida 3 a 4 semanas após. A partir daí, re-vacinar os animais a intervalos de 12 meses. O esquema de vacinação poderá ser alterado segundo recomendação do Médico Veterinário. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Ampla proteção contra as clostridiose, incluindo o Botulismo
- Altos níveis de proteção

Hertamax-10

Descrição e indicações: prevenção contra Clostridioses que afetam os bovinos, ovinos e caprinos, incluindo o Tétano e a Hemoglobinúria Bacilar.

Formulação: suspensão de toxóides e bacterinas do *Clostridium chauvoei; C. sordellii; C. septicum; C. perfringens* Tipos B e D; *C. novyi; C. tetani; e C. haemolyticum*

Apresentações comerciais: Frascos com 16 doses e frascos com 83 doses

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2 C e 8 C). Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via subcutânea a dose de 3 mL por animal. Esquema de vacinação:
- **Filhos de mães não vacinadas:** 1a dose ao 7 dias de idade repetindo-se aos 30 dias e aos 6 meses de idade.
- **Filhos de mães vacinadas:** 1a dose aos 30 dias de idade e aos 6 meses de idade.
- **Revacinações:** 6/6 meses nas regiões de alto desafio ou 12/12 meses.
- Consultar o Médico Veterinário para esquemas de vacinação diferentes.
- Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios: Ampla proteção as principais clostridioses dos bovinos, ovinos e caprinos, incluindo o tétano e a hemoglobinúria bacilar.

IBR-BVD

Descrição e indicações: vacina indicada para a prevenção da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Vulvovaginite Pustular Infecciosa Bovina e Diarréia Viral Bovina (BVD) nos bovinos.

Formulação: Vírus IBR-Colorado; BVD-NADL e BVD-Nova Iorque

Apresentações comerciais: Frascos com 20 doses

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2 C e 8 C). Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via subcutânea a dose de 5 mL por animal, a partir de 6 meses de idade. Em animais vacinados pela primeira vez, repetir a vacinação 28 dias após a 1a dose. Revacinar 12/12 meses. Este esquema pode ser alterado segundo orientação do Médico Veterinário. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Proteção contra as principais viroses reprodutivas e respiratórias dos bovinos
- Auxilia no incremento dos índices reprodutivos nos bovinos

Leptovac 6

Descrição e indicações: vacina contendo as principais cepas de *Leptospira spp* indicada para a prevenção da Leptospirose dos bovinos, suínos, ovinos e caprinos.

Formulação: suspensão de *Leptospira hardjo*; *L. pomona; L. wolf; L. canicola; L. grippotyphosa;* e *L. icterohaemorrhagiae* inativadas pelo formol e adsorvidas em hidróxido de alumínio.

Apresentações comerciais: Frascos com 10 doses

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2 C e 8 C). Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via subcutânea a dose de 5 mL por animal. A 1ª dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade, sendo repetida outra dose 21 dias após. Revacinações 6 em 6 meses ou a critério do Médico Veterinário, sendo recomendada uma dose 30 dias antes da estação reprodutiva. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Proteção contra a leptospirose bovina, suína, ovina e caprina
- Auxílio no incremento dos índices reprodutivos da produção de carne e leite

Rabmune

Descrição e indicações: vacina para prevenção da raiva dos bovinos, equinos, ovinos e caprinos.

Formulação: suspensão do vírus rábico PV inativado.

Apresentações comerciais: Frascos com 25 doses

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via subcutânea a dose de 2 mL por animal. Em animais jovens a 1ª dose deve ser aplicada aos 3 meses de idade ou antes disso a critério do médico veterinário, repetindo-se outra dose 30 dias após. Em animais adultos sem histórico de vacinação contra a Raiva ou que nunca receberam a vacinação (animais de compra ou recém chegados em área de risco), aplicar uma dose imediatamente e repetir outra dose 30 dias após. Revacinações de 12 em 12 meses. O critério de vacinações poderá ser alterado segundo recomendação do Médico Veterinário ou programa oficial da autoridade sanitária. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Proteção efetiva contra a raiva dos herbívoros
- Multi-espécies, inclusive indicada para equídeos

Tifopasteurina

Descrição e indicações: vacina indicada para a prevenção da Pasteurelose Bovina e do Paratifo dos Bezerros.

Formulação: suspensão inativada contendo *Salmonella dublin; Pasteurella multocida;* e *Salmonella typhimurium*.

Apresentações comerciais: Frascos com 25 doses.

Instruções de uso: manter sob refrigeração (entre 2 C e 8 C). Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via subcutânea a dose de 2 mL de acordo com o esquema a seguir:
- **Vacas:** 8° mês de gestação (30 dias antes do parto)
- **Bezerros(as):** 1ª dose entre os 15 e 30 dias de idade repetindo-se outra dose 30 dias após.
- **Surtos:** vacinar, ao mesmo tempo, todos animais do rebanho

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Proteção contra o paratifo dos bezerros(as) e a pasteurelose bovina
- Proporciona condições para melhor desenvolvimento dos bezerros(as)
- Maior produção de carne e leite

Ectoparasiticidas

Cicatrilex Prata

Descrição e indicações: cicatrizante, preventivo e curativo de bicheiras para uso em bovinos.

Formulação: cipermetrina 0,5% + azametifós 1% + sulfadiazina de prata 0,1%

Apresentações comerciais: Frascos de 500 mL

Instruções de uso: agitar antes de usar. Limpar a região do ferimento com uma gaze limpa. Posicionar o tubo verticalmente com a válvula para cima, a uma distância de aproximadamente 20 cm da ferida. Pressionar a válvula e aplicar quantidade suficiente para cobrir toda a ferida e as áreas circunvizinhas. Não administrar concomitantemente agentes colinesterásicos como o levamisole, morantel e pirantel e nem com enzimas proteolíticas como colagenase e protease.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Prevenção e tratamento de miíases nos bovinos
- A sulfadiazina de prata agiliza a cicatrização de ferimentos cirúrgicos ou acidentais

Cyperclor Plus Pour On

Descrição e indicações: carrapaticida, mosquicida, bernicida, sarnicida e piolhicida, proporcionando completo controle de ectoparasitos nos bovinos e suínos. Possui sinergista para o controle dos ectoparasitos, especialmente o carrapato, e ação repelente sobre moscas.

Formulação: Cipermetrina 5% + Clorpirifós 7% + Butóxido de Piperonila 5% + Citronelal 0,5%

Apresentações comerciais: Frascos dosadores de 1L e frascos dosadores de 2L

Instruções de uso: produto pronto para uso. Aplicar sobre o dorso (fio do lombo) do animal, desde o pescoço até a inserção da cauda. Doses indicadas:

- **Bovinos:** 10 mL/100 Kg de p.v.
- **Suínos:** 2,5 mL/50 Kg p.v.

Não utilizar: fêmeas em estado avançado de gestação; animais debilitados, sedentos ou com problemas hepáticos; bubalinos; em horários de sol a pino e dias muito quentes. Em vacas lactantes, lavar e secar o úbere antes da ordenha que for realizada após a aplicação. Evitar o uso concomitante com outros produtos a base de organofosforados e carbamatos. Não aplicar sobre áreas de pele com ferimentos ou cobertas com lama e esterco.

Período de carência: Leite: 3 dias • **Abate:** 10 dia

Benefícios:

- O produto de maior eficácia sobre os principais ectoparasitos dos bovinos e suínos de acordo com os diversos biocarrapaticidogramas realizados por diversos laboratórios oficiais.
- Facilidade na aplicação e maior precisão na aplicação da dose necessária
- Presença de agente sinérgico à cipermetrina na formulação, possibilitando o controle de cepas do carrapato resistentes a este ativo

Cyperclor Plus Pulverização

Descrição e indicações: carrapaticida, mosquicida e bernicida em concentrado emulsionável para uso em bovinos após a diluição na água.

Formulação: Cipermetrina 15% + Clorpirifós 25% + Butóxido de Piperonila 15%

Apresentações comerciais: Frascos de 1L e frascos de 250 mL

Instruções de uso: o produto deve ser diluído em água limpa na proporção de 1 parte de produto para 800 partes de água (1 litro/800 litros de água ou 25 mL/20 litros d'água). Realizar a pré-diluição antes da obtenção da mistura total final, homogeneizando a quantidade desejada do produto em pequeno volume de água (por exemplo: 25 mL/0,5 L de água) e posteriormente completar o volume total final da mistura. Após a preparação da calda, aplicar 4 L a 5 L da mesma sobre todo o corpo do animal. Utilizar pulverizador com pressão adequada e bico em leque. Pulverizar a calda preparada sempre no sentido inverso aos pelos (contra os pelos), procurando atingir a pele. Não utilizar em: animais jovens; fêmeas prenhes; horas e dias muito quentes e de sol a pino; junto a outros organofosforados ou carbamatos.
Após a abertura do frasco, utilizar em até 6 meses.

Período de carência: Leite: 3 dias • **Abate:** 10 dia

Benefícios:

- O produto de maior eficácia sobre os principais ectoparasitos dos bovinos e suínos de acordo com os diversos biocarrapaticidogramas realizados por diversos laboratórios oficiais.
- Presença de agente sinérgico na formulação, permitindo o controle de cepas do carrapato resistentes a cipermetrina

Cyperpour 15 Pulverização

Descrição e indicações: produto emulsionável para tratamento e controle das infestações da mosca dos chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

Formulação: Cipermetrina 15%

Apresentações comerciais: Frascos de 20 mL e frascos de 1L

Instruções de uso: realizar a diluição em água de 1 parte do produto em 1.000 partes de água (1 L/1.000 L de água, ou 20 mL/20 L d'água). Realizar a pré-diluição misturando a quantidade total de produto desejada em pequena quantidade de água (por exemplo, 20 mL de produto/ 200 mL de água) e, posteriormente, completar com o volume total de água desejado para a preparação da calda. Pulverizar a calda preparada sobre todo o corpo do animal. Não utilizar em dias ou horários muito quentes (sol a pino) e em dias chuvosos. Após a abertura da embalagem, utilizar o produto em no máximo 6 meses.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano • **Abate:** ZERO

Benefícios: Controle da mosca dos chifres proporcionando condições para maior produtividade.

Combo Pour On

Descrição e indicações: produto carrapaticida, mosquicida e bernicida pronto para uso em bovinos.

Formulação: Cipermetrina 5% + Clorpirifós 7% + Butóxido de Piperonila 1%

Apresentações comerciais: Frascos dosadores de 1L e galões de 5L

Instruções de uso: aplicar diretamente sobre a linha dorso-lombar (fio do lombo, entre o pescoço e a base da cauda) na dose de 10 mL/100 Kg p.v. A dosagem máxima recomendada para animais com mais de 600 Kg de p.v. é de 60 mL. Após a abertura do frasco, utilizar o produto em no máximo 6 meses. Não aplicar em: animais jovens, doentes, debilitados, sedentos ou muito estressados; fêmeas no terço final da gestação; sobre áreas de pele com ferimentos ou cobertas de lama ou esterco; em horários de calor intenso (sol a pino); em dias chuvosos. Caso ocorram chuvas até 24 horas após o tratamento, recomenda-se repetir o mesmo. Não aplicar junto a outros organofosforados e/ou carbamatos, relaxantes musculares e tranquilizantes.

Período de carência: Leite: 24 horas (1 dia) • **Abate:** 6 dias

Benefícios:
- Controle fácil e eficiente de importantes ectoparasitos dos bovinos em um único produto
- Formulação com agente sinergista da cipermetrina, facilitando o controle das cepas de ectoparasitos resistentes a este ativo
- Baixo período de carência no leite

Fiproline BV

Descrição e indicações: carrapaticida pronto para uso em bovinos.

Formulação: Fipronil 1%

Apresentações comerciais: Frascos dosadores de 1L e galões de 5L

Instruções de uso: produto pronto para uso. Aplicar diretamente e de forma uniforme sobre a linha dorso-lombar dos animais, a dose de 1 mL/10 Kg de p.v., estendendo-se desde a nuca até a base da cauda. A dose mínima por animal é de 10 mL. Não aplicar em dias chuvosos ou em animais com a pele molhada. Chuvas após o tratamento dos animais poderão reduzir o período de controle do carrapato ("arraste" do produto). Evitar sobredosagens, especialmente em animais debilitados ou sob estresse intenso. Não indicado para vacas prenhes. Não aplicar sobre áreas de pele com ferimentos ou cobertas com lama e esterco.

Período de carência:
Leite: não aplicar em vacas que produzam leite para consumo humano. • **Abate:** 50 dias

Benefícios:
- Moderno e eficaz carrapaticida
- Pode proporcionar maiores intervalos entre tratamentos para efetivo controle do carrapato
- Seguro para animais jovens

Fluron Gold

Descrição e indicações: moderna e inovadora formulação carrapaticida, mosquicida e bernicida pronta para uso nos bovinos. O produto possui dois carrapaticidas de contato que controlam todos os estágios parasitários do carrapato (cepas sensíveis), um sinergista que contribui para aumento da eficácia da cipermetrina, além de efeito sistêmico através de um inibidor do desenvolvimento das fases parasitárias juvenis. Assim contribui para o efetivo controle do carrapato tanto nos animais quanto na redução significativa das infestações nas pastagens quando empregado em programas estratégicos integrados de controle desse ectoparasito.

Formulação: Cipermetrina 5% + Clorpirifós 7% + Fluazuron 2,5% + Butóxido de Piperonila 5%

Apresentações comerciais: Frascos dosadores de 1L e Frascos dosadores de 2L

Instruções de uso: produto pronto para uso. Aplicar diretamente sobre a linha dorso-lombar (fio do lombo) dos animais, numa faixa entre o pescoço e a base da cauda, em doses de 1 mL/10 Kg p.v. ou 10 mL/100 Kg p.v. Não aplicar sobre áreas de pele com ferimentos ou cobertas com lama e esterco. Não usar em animais jovens, debilitados, sob intenso estresse, vacas prenhes, nas horas mais quentes do dia (sol a pino), em dias chuvosos.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano. • **Abate:** 56 dias

Benefícios:
- Formulação exclusiva que combina dois ingredientes carrapaticidas que agem por contato a um agente sistêmico que inibe os estágios parasitários juvenis e reduz a fertilidade dos ovos das teleóginas que escapem ao tratamento;
- Possui sinergista da cipermetrina na formulação, auxiliando este ativo no controle do carrapato;
- Auxilia na "limpeza" das pastagens com relação às infestações por carrapatos, quando empregado em programas estratégicos integrados de controle desse ectoparasito;
- Proporciona condições para o aumento da produtividade bovina

Endectocidas

ADE-TEC

Descrição e indicações: endectocida vitaminado injetável que permite o controle dos principais parasitos internos e externos e a correção de carências das vitaminas A, D e E em bovinos.

Formulação: Ivermectina 1% + Vitamina A 25.000.000 UI + Vitamina D 7.000.000 UI + Vitamina E 5.000 UI

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL, 250 mL, 500 mL e 1L

Instruções de uso: aplicar por via subcutânea, 1 mL/50 Kg de p.v. Não aplicar no mesmo ponto doses superiores a 10 mL. Após a abertura do frasco, utilizar o produto no intervalo máximo de 90 dias.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano. • **Abate:** 32 dias

Benefícios:
- Controle das principais verminoses dos bovinos, berne e auxílio no controle do carrapato
- Correção das carências das Vitaminas A, D3 e E que são importantes nos animais em crescimento, na prenhez e lactação, na convalescença e situações de estresse
- Permite condições para melhor produtividade nos bovinos

Puritec Gold

Descrição e indicações: endectocida injetável para bovinos, de fácil aplicação, que permite o controle e a prevenção das principais verminoses gastrintestinais e pulmonar, do berne e do carrapato por período prolongado.

Formulação: Ivermectina 3,5%

Apresentações comerciais: Frascos de 500 mL e 1L

Instruções de uso: Este produto tem venda sob prescrição do médico veterinário, com retenção obrigatória da notificação da receita. Consulte seu médico veterinário.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano. • **Abate:** 117 dias

Benefícios:
- Produto com ótima fluidez propiciando facilidade na aplicação
- Controle das principais verminoses dos bovinos, contribuindo para melhor ganho de peso, maior produtividade durante a vida útil das fêmeas na fazenda (maior número de crias e lactações) e antecipação da idade ao abate dos machos
- Controle do carrapato por até 42 dias

Fluron®
GOLD

Controle o carrapato do início ao fim!

Ticson 3.50

Descrição e indicações: endectocida tixotrópico concentrado para uso em bovinos, indicado no tratamento curativo e preventivo das infecções pelos principais vermes gastrintestinais, e infestações pelo carrapato e berne.

Formulação: Ivermectina 3,5% em formulação tixotrópica e que permite longo período de controle de importantes parasitos dos bovinos. A tixotropia é uma característica que permite maior fluidez do produto após agitação, facilitando sua aplicação parenteral.

Apresentações comerciais: Frascos de 500 mL e 1L

Instruções de uso: Este produto tem venda sob prescrição do médico veterinário, com retenção obrigatória da notificação da receita. Consulte seu Médico Veterinário.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano. • **Abate:** 109 dias

Benefícios: Permite condições para melhor produtividade quando aplicado em programas estratégicos integrados de controle parasitário para bovinos.

Ticson Classic

Descrição e indicações: endectocida injetável para uso nos bovinos quando se pretende o controle das principais verminoses e bernes. Também é indicado na prevenção da instalação de bicheiras no coto umbilical dos animais recém nascidos e em feridas. Auxilia no controle das infestações por carrapatos, piolhos e sarnas.

Formulação: Ivermectina 1%

Apresentações comerciais: Frascos de 500 mL e 1L

Instruções de uso: aplicar por via subcutânea a dose de 1 mL/50 Kg de p.v. Na prevenção da instalação das bicheiras do coto umbilical dos animais recém-nascidos, aplicar o produto logo após o nascimento ou no máximo dentro das primeiras 24 horas de vida. Para a prevenção da instalação de bicheiras em ferimentos cirúrgicos (castrações, descornas), aplicar imediatamente antes ou logo após o procedimento, realizando também tratamento tópico com Cicatrilex Prata.

Período de carência:
Leite: não utilizar em vacas que produzam leite para consumo humano. • **Abate:** 28 dias

Benefícios: Controle e auxílio no controle das principais parasitoses dos bovinos, contribuindo para melhores índices de produtividade.

Ambiental

Swat NF

Descrição e indicações: produto mosquicida com atrativo, indicado para o controle da mosca doméstica. A mosca doméstica é vetor de importantes doenças que podem afetar os bovinos tais como: as mastites, a ceratoconjutivite infecciosa, otite parasitária, dentre outras.

Formulação: Azametifós 1%

Apresentações comerciais: Sachés de 25 g

Instruções de uso: dispor o produto em pequenos recipientes, distribuídos estrategicamente nos locais de concentração das moscas e que não sejam acessíveis à animais e as crianças. A proporção é de 2 g do produto para cada m^2. O efetivo controle das moscas exige exposição constante das mesmas ao produto ou a outros mosquicidas. Trocar quando houver grande acúmulo de pó sobre o produto ou quando o mesmo perder a sua atratividade para as moscas.

Benefícios:
- Controle das infestações por moscas domésticas, auxiliando no bem-estar dos animais e na prevenção das doenças veiculadas pelas mesmas
- Contém atrativo sexual para aumentar a efetividade do controle
- Contém amargante para evitar ingestão acidental

Hormônios Para Reprodução

Afisterone

Descrição e indicações: solução oleosa contendo hormônio luteínico indicada para a fêmea bovina e éguas onde o aporte extra com progesterona seja necessário (implantação embrionária e manutenção da prenhez, cio prolongado, vulvites e queda na produção leiteira devido a altos níveis estrogênicos de origem natural ou artificial).

Formulação: Progesterona Cristalizada 1%

Apresentações comerciais: Frascos de 20 mL

Instruções de uso: aplicar por via intramuscular, respeitando-se a indicação de doses segundo a anomalia a ser tratada:

- **Esterilidade devido ao baixo aporte de progesterona:** 10 mL a 20 mL logo após a cobertura ou fecundação artificial (inseminação artificial, implantação de embrião)
- **Aborto precoce das éguas:** 10 mL, repetindo-se o tratamento 8 dias depois
- **Cio prolongado:** 5 mL no início do cio
- **Vulvite, queda na produção leiteira devido a tratamento estrogênico:** 10 mL a 20 mL dependendo da severidade do quadro

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Auxilia para melhores índices de prenhez, menor intervalo entre partos, possibilitando maior produção de leite e de crias.
- Pode ser aplicado no momento da inserção de dispositivos de progesterona em animais recebendo protocolos hormonais para IATF para melhorar o controle de emergência da onda folicular.
- Pode ser aplicado com segurança em animais prenhes

Androgenol

Descrição e indicações: solução oleosa contendo o hormônio masculino, indicada no atraso do desenvolvimento sexual e na preparação de touros, garanhões, cachaços, carneiros e bodes para a estação reprodutiva.

Formulação: Propionato de Testosterona 1% (10 mg/10 mL)

Apresentações comerciais: Frascos de 10 mL

Instruções de uso: o esquema de tratamento deverá ser iniciado 30 dias antes da estação reprodutiva, com 5 injeções intervaladas por 3 dias entre elas. As injeções deverão ser por via intramuscular profunda nas seguintes as doses:

- **Touros, garanhões e cachaços de grande porte:** 10 mL
- **Cachaços de médio porte, carneiros e bodes:** 5 mL
- **Carneiros e bodes de pequeno porte:** 2 mL a 3 mL

Uma vez aberta a ampola, o produto deverá ser utilizado imediatamente.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Auxilia na melhora da libido dos machos reprodutores com possível melhores taxas de prenhez nas fêmeas servidas pelos mesmos
- Pode ser utilizado para melhorar libido em rufiões machos ou fêmeas de forma a melhorar a capacidade do rufião em detectar cios

Benzoato HC

Descrição e indicações: solução pronta para uso indicada para a fêmea bovina, quando se deseja altos níveis plasmáticos de estradiol com maior rapidez e num período mais curto. Assim pode possibilitar melhor performance reprodutiva da fêmea bovina e o esvaziamento uterino quando é desejado (retenções de placenta, fetos mumificados, infecções uterinas, etc).

Formulação: Benzoato de Estradiol 0,1%

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL

Instruções de uso: administrar por via intramuscular doses de 2 mL a 3 mL de acordo com a terapia desejada (protocolos de IATF; indução da ovulação; esvaziamento uterino). Esse regime de dosagem pode ser modificado pelo Médico Veterinário. Uma vez perfurado o frasco, utilizar o produto num período máximo de 30 dias.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** 1 dia (24 horas)

Benefícios:

- Auxilia para o encurtamento do período de serviço e do intervalo entre partos
- Auxilia para maior número de crias e de lactações durante a vida útil da fêmea bovina
- Auxilia para melhor efetividade dos tratamentos de infecções uterinas
- Estradiol de escolha no momento de inserção de dispositivos de progesterona durante protocolos hormonais para IATF devido a sua meia vida curta
- Pode ser utilizado também no momento da retirada do dispositivo de progesterona ou 24h após a retirada do dispositivo

Cipionato HC

Descrição e indicações: produto a base de estradiol indicado quando o objetivo é manter níveis plasmáticos de estradiol por período intermediário. Permite o esvaziamento uterino e redução nos manejos em protocolos de IATF.

Formulação: Cipionato de Estradiol 0,1%

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL

Instruções de uso: administrar por via intramuscular profunda. Em protocolos de sincronização de cios e inseminação artificial em tempo fixo é recomendado 1 mL de Cipionato HC no momento da retirada do dispositivo de progesterona. Após a perfuração da rolha, utilizar o produto imediatamente.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Possibilita melhor performance reprodutiva da fêmea bovina quando empregado em protocolos de indução e sincronização de cios
- Redução de manejos nos protocolos de IATF sem diminuição de índices de concepção

Pluset

Descrição e indicações: produto a base de gonadotrofinas (FSH e LH) indicado na estimulação do desenvolvimento folicular ovariano e na indução de superovulações nas vacas adultas.

Formulação: liofilizado com 500 UI de FSH e 500 UI de LH

Apresentações comerciais: cartuchos com 2 frascos-ampola de FSH e LH + 1 frasco com 20 mL de água destilada apirogênica.

Instruções de uso: após a reconstituição dos dois frascos com os liofilizados (FSH e LH) no diluente e completa homogeneização, aplicar por via intramuscular profunda. Após a reconstituição, manter o frasco sob refrigeração (2 C a 8 C) por até 6 dias. O protocolo de superovulação exige aplicações de doses decrescentes de Pluset a cada 12 horas, durante 5 dias. Sugestão: aplicar o volume de doses indicado às 08:00 e as 20:00 horas de cada dia (Dia 1: 3 mL; Dia 2: 2,5 mL; D 3: 2 mL; D 4: 1,5 mL; D 5: 1 mL). O tratamento deverá ser combinado com luteolíticos (prostaglandina). O esquema de tratamento pode ser alterado segundo orientação do Médico Veterinário.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Melhor eficiência em protocolos de superovulações para produção de embriões *in vivo*
- Melhora qualidade oocitária em protocolos para Ovum pick Up (OPU) em vacas sob programa de produção de embriões *in vitro*

Veteglan

Descrição e indicações: luteolítico indicado para uso em bovinos quando a regressão do corpo lúteo ovulatório é desejada (Sincronização de cios, protocolos de IATF, abortos quando de gestações indesejáveis, como coadjuvante nos casos de piometra, endometrites).

Formulação: D (+) Cloprostenol 0,75% (correspondente 7,9 mg de D (+) Cloprostenol/100 mL)

Apresentações comerciais: Frascos de 20 mL

Instruções de uso: administrar por via intramuscular, 2 mL/animal. Em protocolos de sincronização de cios sem observação de corpo lúteo, aplicar duas doses intervaladas por 11 dias. Caso ocorra cio, inseminar artificialmente ou conduzir a vaca para a monta natural. Caso o cio não tenha sido observado, realizar 2 inseminações artificiais a 56 e 72 horas após a 2ª dose. Em protocolos de IATF realizar o tratamento quando da retirada do dispositivo intravaginal de progesterona (Prociclar). Para indicações terapêuticas, aplicar 2 mL/animal.
OBS: para que o produto exerça plana ação é necessária a presença de corpo lúteo responsivo à prostaglandina.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Possibilita a melhoria da performance reprodutiva na fêmea bovina (maior número de crias e lactações na vida útil)
- Racionalização do manejo da estação de parições e de crias
- Eficiente ação de regressão de corpos lúteos durante programs de IATF ou indução de cios em animais com CL responsivos (> 5 dias).
- Pode ser utilizado no tratamento de infecções uterinas associadas a presença de CL persistentes
- Pode ser utilizado em protocolos de pré-sincronização em rebanhos leiteiros

Prociclar

Descrição e indicações: dispositivo intravaginal de progesterona indicado nos protocolos de sincronização de cios e IATF.

Formulação: cada dispositivo contém 750 mg de Progesterona Micronizada.

Apresentações comerciais: Pacotes com 10 implantes intravaginais.

Instruções de uso: calçar as mão com luvas de látex. Introduzir o dispositivo no aplicador e desinfetar em solução de amônia quaternária 0,5%. Higienizar a região peri-vulvar da fêmea e aplicar o dispositivo intravaginalmente.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Utilizado em protocolos de sincronização de cios e IATF
- Pode ser utilizado com sucesso para indução de puberdade em novilhas ou ciclicidade em vacas no pós-parto

Hormônio não reprodutivo

Ocitovet

Descrição e indicações: produto pronto para uso indicado quando a contração da musculatura lisa é desejada (indução de partos, expulsão da placenta retida, esvaziamento uterino, descida do leite, involução uterina pós-cesariana, coadjuvante na síndrome MMA em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

Formulação: Ocitocina sintética 1 UI/mL

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL

Instruções de uso: administrar por via intramuscular, subcutânea ou intravenosa. Quando pelas vias im ou sc, o efeito inicia-se em 6 a 10 minutos. O seguinte esquema de dosagens é recomendado, segundo o efeito desejado e procedimento:
- **Uso ginecológico**
  - **Vacas:** 7,5 mL a 10 mL
  - **Éguas:** 7,5 mL a 15 mL
  - **Porcas, ovelhas e cabras:** 3 a 5 mL
- **Descida do leite:**
  - **Vacas e éguas:** 1 mL a 2 mL
  - **Porcas, ovelhas e cabras:** 0,5 mL a 2 mL

Não tem efeito acumulativo, podendo ser repetida. Evitar sobredosagens, não administrar em partos distócicos ou quando não houver dilatação adequada da cérvix uterina.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Rápido esvaziamento uterino
- Ordenha ágil e completa

Tripanocida

Vivedium

Descrição e indicações: tripanocida específico de alta eficácia e alta persistência para uso em bovinos.

Formulação: Cloreto de isometamidium 2%

Apresentações comerciais: Frascos contendo 4g + diluen te de 200 mL e frascos contendo 1g + diluente de 50 mL

Instruções de uso: adicionar o diluente no frasco com o pó e homogeneizar completamente. Após a diluição, aplicar por via intramuscular, preferencialmente na "tábua" do pescoço, 1 mL/20 Kg p.v. Usar a solução imediatamente após o seu preparo. Não aplicar mais que 15 mL por ponto de aplicação. Não aplicar outro tripanocida ao mesmo tempo.
Esquema de controle da tripanosomose:
- Aplicar Vivedium a intervalos de 3 ou 4 meses em todo o rebanho, de acordo com a epidemiologia local da tripanossomose ou consulte o Médico Veterinário para elaboração de um programa de controle personalizado.

Período de carência: Leite: 3 dias • **Abate:** 30 dias

Benefícios:
- Controle efetivo da tripanossomose bovina, com alta eficácia e persistência prolongada (2 a 4 meses)
- Redução da mortalidade e da morbidade causadas pela tripanosomose, possibilitando maior produtividade e lucratividade

TRIPA NOSSO MOSE

agora só se você permitir

VIVEDIUM

ÚNICO MEDICAMENTO EXCLUSIVO CONTRA A TRIPANOSSOMOSE LICENCIADO DO PAÍS!

ceva

Suplementos

Rehydion

Descrição e indicações: gel pronto para uso para bezerros(as), indicado quando se desejar suplementação hidroeletrolítica, como nos casos onde é necessária a reidratação (convalescença de várias doenças como diarréias e pneumonias, por exemplo).

Formulação: cada 100 mL do produto contém pelo menos 11,5% de Sódio, 4,5% de Potássio, 8,6% de Cloretos.

Apresentações comerciais: Frascos com 320 mL

Instruções de uso: administrar exclusivamente por via oral após a preparação da solução hidratante. Para a preparação desta solução, agitar o frasco, medir 20 mL de Rehydion com auxílio do copo dosador e misturá-lo em 1 L de leite ou água morna. Quando administrado com leite o produto colabora com a formação do coágulo lácteo e também com a nutrição do animal, por isso é a melhor escolha para administrar o Rehydion. Fornecer 2 L da solução preparada de cada vez, duas vezes ao dia (correspondente a 80 mL de Rehydion) por dois dias consecutivos.

Período de carência: ZERO

Benefícios:
- Auxilia na rápida recuperação e na redução da mortalidade de bezerros(as) em tratamento contra doenças que levam a desidratação.
- Pode ser misturado com o leite contribuindo com a nutrição do animal

ADE

Descrição e indicações: suplemento de vitaminas A, D e E para uso nos bovinos e nos ovinos em situações carenciais, na convalescença, na melhoria da conversão alimentar, fertilidade e produtividade em geral, nos bovinos.

Formulação: cada 100 mL contém 2.500.000 UI de Vitamina A (Retinol) + 500.000 UI de Vitamina D3 (Calciferol) + 1.650 UI de Vitamina E (Tocoferol)

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL, 100 mL e 200 mL

Instruções de uso: administrar por via intramuscular em dose única ou em doses repetidas a cada 2, 4 ou 6 semanas e de acordo com a recomendação do Médico Veterinário. Doses:
- Bezerros(as): 1 a 5 mL
- Bovinos em recria e engorda; vacas lactantes ou gestantes : 5 mL a 10 mL
- Ovinos: 1 a 3 mL

Não aplicar mais que 10 mL por ponto de aplicação. Após a abertura do frasco, todo seu conteúdo deverá ser usado.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Permite maior produtividade quando empregado nos momentos de maior exigência nutricional (fases de cria e recria em bovinos e ovinos)
- Possibilita a correção de carências das Vitaminas A, D e E em fases críticas em termos nutricionais (período das secas, por exemplo)
- Permite a aceleração da retomada dos níveis de produtividade após períodos críticos do ano (secas, por exemplo)
- Pode auxiliar a performance reprodutiva quando aplicado na preparação dos animais para estações reprodutivas
- Ajuda na recuperação de animais convalescentes

Calcifós

Descrição e indicações: suplemento energético para bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos, contendo Cálcio, Magnésio e Fósforo indicado em situações como: febre vitular (febre do leite) ou hipocalcemia, acetonemia, tetanias em geral, eclâmpsia gravídica, paraplegia pré e pós parto, convulsões e nas deficiências de fósforo.

Formulação: Gluconato de Cálcio 20% + Hipofosfito de Sódio 3,2% + Cloreto de Magnésio 1,9% + Dextrose 5% + Ácido Bórico 4%

Apresentações comerciais: Frascos de 200 mL e frascos de de 500 mL + agulha e equipo.

Instruções de uso: administrar lentamente por via intravenosa. As vias intramuscular e subcutânea podem também ser empregadas, desde que as injeções sejam aplicadas em diversos pontos. Doses:
- Animais de pequeno e médio porte: 10 mL a 50 mL
- Animais de grande porte: 50 mL a 500 mL

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios: Rápida resposta e retorno a produção

Hertavita

Descrição e indicações: solução injetável contendo vitaminas, aminoácidos e minerais para uso em bovinos nas situações de desidratação e enfraquecimento geral, no pré e pós operatório, na acetonemia, na esgotamento físico e como adjuvante no tratamento de doenças infecciosas.

Formulação: cada frasco com 500 mL contém 10 mg de Vit. B1 (Tiamina) + 50 mg de Vit. B2 + 10 mg de Vit. B6 + 1 g de Nicotinamida + 150 mg de Pantotenato de Cálcio + 1,5 g de DL Metionina + 2,75 g de Cloreto de Sódio + 185 mg de Cloreto de Potássio + 150 mg de Cloreto de Cálcio (= 198 mg de Cloreto de Cálcio diidratado) + 150 mg de Cloreto de Magnésio (= 321 mg de Cloreto de Magnésio Hexaidratado). Cada ampola de 3 mL contém 10 mg de Vit. B12 (Cianocobalamina)

Apresentações comerciais: Frascos de 500 mL + ampola de 3 mL (Vitamina B12) + agulha e equipo.

Instruções de uso: injetar o conteúdo da ampola (Vit. B12) no frasco, montar o equipo mais agulha no frasco. Imediatamente após o preparo, aplicar a solução lentamente por via intravenosa o volume entre 1.000 mL a 2.000 mL ou a critério do Médico Veterinário, que também determinará o intervalo entre aplicações.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Auxilia na rápida recuperação dos animais desidratados, esgotados, fracos e convalescentes
- Como tratamento nos quadros de acetonemia

Hertaka

Descrição e indicações: anti-hemorrágico pronto para uso em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos indicado nos casos de hemorragias internas ou externas, intoxicação por cumarínicos e em tratamentos prolongados com sulfonamídicos e antibióticos que deprimem os níveis de vitamina K.

Formulação: Vitamina K 0,2%

Apresentações comerciais: Frascos de 20 mL

Instruções de uso: pronto para uso em injeções intramusculares profundas ou intravenosas lentas, pelo período necessário para normalizar a coagulação (2 a 4 dias). A dose é de 1 mL/5 Kg p.v.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios: Auxilia na correção de estados hemorrágicos

Roboforte

Descrição e indicações: tônico revigorante com formulação exclusiva de alto valor biológico contendo minerais, vitaminas e 18 aminoácidos, indicado em situações de desequilíbrio metabólico e/ou energético dos bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos. Atua como fonte de cálcio e fosforilcolina e Vitamina B12. A fosforilcolina fornece acetilcolina aos processo metabólicos orgânicos. A Vit. B 12 é importante para o metabolismo das gorduras no fígado, estimula a hematopoiese e contribui para crescimento da flora fisiológica ruminal e intestinal. O produto ainda é fonte de aminoácidos necessários para a regeneração e crescimento muscular.

Formulação: Cálcio-fosforilcloreto de colina 5% + Caseína-peptídeos 5% + Vitamina B12 0,005%

Apresentações comerciais: Frascos de 100 mL e frascos de 250 mL

Instruções de uso: produto para uso parenteral através de injeções intravenosas, intramusculares ou subcutânea, segundo a espécie animal.
- Bovinos adultos: 10 mL a 25 mL im ou sc
- Bezerros(as): 5 mL a 15 mL im ou sc
- Equinos adultos: 10 mL a 20 mL im ou iv lenta (diluir 4 partes de Roboforte em 96 partes de soro fisiológico ou Hertavita em aplicação lenta)
- Potros(as): 5 mL a 15 mL im ou iv lenta como descrito acima para equinos adultos.
- Ovinos e caprinos adultos: 3 mL a 5 mL im ou sc
- Ovinos e caprinos jovens: 2 mL a 3 mL im ou sc
- Suínos: 5 mL a 10 mL sc

A dose pode ser reduzida à metade quando aplicada em animais em bom estado. Os tratamentos poderão ser repetidos a critério do Médico Veterinário.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:
- Permite melhor desempenho no crescimento, no ganho de peso e na produção de leite (maior produtividade)
- Estimula o metabolismo de proteínas: músculo, sangue e anticorpos
- Auxilia na recuperação de enfermidades
- Em confinamentos melhora a adaptação à dieta e promove melhor aproveitamento dos nutrientes

Sedativos

Anasedan

Descrição e indicações: sedativo, analgésico e relaxante muscular para uso em bovinos e equinos. É indicado em procedimentos cirúrgicos com ou sem associação com anestesia e no manejo de animais muito reativos. O efeito obtido tem relação com a dose administrada.

Formulação: Xilazina 2%

Apresentações comerciais: Frascos de 10 mL

Instruções de uso: Este produto tem venda sob prescrição do médico veterinário, com retenção obrigatória da notificação da receita. Consulte seu médico veterinário.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios: Permite tranquilidade e precisão nas intervenções cirúrgicas e em práticas de manejo (transporte, pesagens, etc).

Dopalen

Descrição e indicações: anestésico geral para uso em bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos, particularmente nas cirurgias de curta duração e na contenção.

Formulação: Cloridrato de ketamina 11,6% (=10% de ketamina base).

Apresentações comerciais: Frascos de 10 mL

Instruções de uso: Este produto tem venda sob prescrição do médico veterinário, com retenção obrigatória da notificação da receita. Consulte seu médico veterinário.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios:

- Permite a execução de procedimentos cirúrgicos e práticas de manejo de forma segura para o animal e para o profissional
- Pode ser associado ao Anasedan na indução anestésica

Dorfin

Descrição e indicações: anestésico local para uso em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos quando se pretende a supressão da dor. Pode complementar o efeito anestésico de Anasedan ou de Dopalen.

Formulação: Lidocaína 2%

Apresentações comerciais: Frascos de 50 mL

Instruções de uso: Dorfin pode ser usado através de gotejamento ou topicamente embebido num chumaço de algodão em anestesia de mucosas; infiltração subcutânea e/ou intramuscular na linha da incisão incisão cirúrgica e próximo a base de tumores ou hérnias; intravenosamente em veias digitais, após garroteamento acima do local de injeção, para procedimentos nos pés e cascos (o garrote deve ser retirado lentamente); por injeção perineural; no bloqueio epidural. Não administrar em animais com problemas cardíacos, hipovolêmicos, junto a anticoagulantes e em áreas inflamadas.

Período de carência: Leite: ZERO • **Abate:** ZERO

Benefícios: Supressão eficiente da dor em casos onde tal procedimento seja necessário.

SINÔNIMO DE **EFICÁCIA.**

Juntos, além da saúde animal

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA
www.ceva.com.br

Rua Manoel Joaquim Filho, nº 303
Paulínia, SP | CEP 13 148-115

0800 770 0355

sac@ceva.com